

Bentagran® M

Çeltikte Yabancı Ot Mücadelesinde Süper Etki



250 gr / lt. Bentazon + 125 gr / lt. MCPA

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCIOTLAR

Bitki Adı	Yabancıot Adı	Kullanma Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
ÇELTİK	Kızotu (<i>Cyperus difformis</i>) Kurbağa Kaşığı (<i>Alisma plantago</i>) Sandalye Sazı (<i>Scirpus mucronatus</i>) Dipotu (<i>Lindernia procumbens</i>) Güvercin Ayağı (<i>Ammania coccinea</i>)	200 ml / da Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde	60 gün

UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ

Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanda yapılmalıdır.

KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ

Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde kullanılır. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 48 saat (2 gün) sonra tavalara tekrar su verilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Önerilen bitkilerde kullanılan herbisit, insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak uygulanabilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması gerekir.




Kızotu (*Cyperus difformis*)




Kurbağa Kaşığı (*Alisma plantago*)



Sandalye Sazı (*Scirpus mucronatus*)



Dipotu (*Lindernia procumbens*)



Güvercin Ayağı (*Ammania coccinea*)