



MISIR TARLALARINDA YABANCIOT MÜCADELESİNDE PROFESYONEL HERBİSİT





PROFESYONEL HERBİSİT

Etkili Madde: Litrede 40 gram Nicosulfuron
Süspansiyon Konsantre (SC)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR			
Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu	Bekleme Süresi
MISIR	ÇİMENŞİ OTLAR Kanyaş (Geliç) (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crusgalli</i>) Benekli Darıcan (<i>E. colonum</i>) Çatalotu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Kirpi Darı (<i>Setaria viridis</i>) GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR Horoziği (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Köpek Üzümlü (<i>Solanum nigrum</i>) Yabani Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>) Pıtrak (<i>Xanthium strumarium</i>)	125 ml/da	30 gün



CAMBİO, Mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancı otlara karşı, çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür. 15–20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler.

Ayrıca, ayırık (*Cynodon dactylon*) ve Topalak (*Cyperus sp.*) otlarını da baskı altında tutar. Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde bromoxynil terkipli ilaçlarla karıştırıldığında etki artar (bromoxynil: 100 ml / da)

İLAÇLAMA ZAMANI

Mısır : 4-8 yaprak arasında ilaçlamayı yapınız.

Çimensi Otlar: Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak)

Kanyaş: İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)

Geniş Yapraklı Yabancı Otlar: Gelişimlerin 2–6 yapraklı oldukları genç dönemleri

KULLANMA ŞEKLİ

- İlacı önce ayrı bir kap içinde suda eritiniz. Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. İyi bir ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak su miktarı dekara 10–40 lt.'dir. Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı artırılmalıdır. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme (11003–11002) kullanılmalıdır.
- İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız.
- İlaçlamadan sonra 4–5 saat içinde yağış olmamalıdır.
- Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.

MÜNEVEBEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

CAMBİO uygulanan tarlalarda, 4 ay sonra sadece buğday, arpa ve soya fasulyesi; 10 ay sonra ise istenilen kültür bitkisi ekilebilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

CAMBİO, Bromoxynil terkipli ilaçlar ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Organik fosforlu ilaçlarla karışmaz

ÖNEMLİ: İlacı kullanmadan önce ambalaj üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.

Zehirlenme durumlarında **UZEM (Ulusal Zehir Merkezi)**'nin 114 numaralı telefonunu arayınız.



AGROFARM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Gülbahar Sokak Baytok Apt. No: 12 D:8 Kat:3
81090-01 Kozyatağı - Kadıköy / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90.216 658 88 50 (pbx) - Fax: +90. 216 410 07 90
www. agrofarm.net