

RALLY® EC 250

SUDA MÜKEMMEL ÇÖZÜNME, ETKİDE MÜKEMMEL BAŞARI



RALLY® EC 250

Litrede 250 gram Tebuconazole

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Külleme (<i>Erysiphe graminis</i>) Sarı Pas (<i>Puccinia striiformis</i>)	75 ml. / da 75 ml. / da	—
Bağ	Külleme (<i>Uncinula necator</i>)	40 ml. / 100L. su	21 gün
Turuncgiller	Alternaria Yanıklığı (<i>Alternaria citri</i>)	100ml. / 100 L. su	21 gün
Domates	Erken Yaprak Yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	50 ml. / 100 L. su	7 gün

RALLY^{EC 250}, SİSTEMİK ÖZELLİKTE BİR İLAÇ OLDUĞUNDAN UYGULAMADAN SONRA BİTKİLERİN HER TARAFINA HOMOJEN OLARAK DAĞILIR VE UZUN SÜRE ETKİLİ OLUR, GENİŞ ETKİ ALANLI VE GÜVENLİDİR.

RALLY^{EC 250} KORUYUCU, TEDAVİ EDİCİ VE ERADİKE EDİCİ ÖZELLİKLERE SAHİPTİR.

HASTALIKLAR NE KADAR ERKEN TEŞHİS EDİLİRSE VE **RALLY^{EC 250}** UYGULANIRSA HASTALIK KONTROLÜ DE O DERECEDE İYİ OLUR.



>> Buğday'da Sarı Pas Hastalığı ilkbaharda hava sıcaklığının 10-15 °C olduğu dönemde görülmeye başlar, yaprakların üst yüzeyinde makina dikişine benzer şekilde püstüller oluşur, sıralar üzerine dizilmiş noktacıklar biçiminde olan bu püstüllerin içinde etmenin (sarı veya turuncu renkte) yazlık sporları meydana gelir ve bu yazlık sporların milyonlarcası ilkbaharda rüzgar ile çevreye yayılır. En erken görülen pas türü olan Sarı Pas, Buğday'ın yaprak, sap ve başaklarında görülür. Hastalık koşullara bağlı olarak % 75'e varan ürün kayıplarına neden olur.



>> Buğday'da Külleme Hastalığı yapraklarda önceleri nokta halinde beyaz-gri renkte püstüller halinde görülür, sonra esmerleşir. Uygun koşullarda püstüller birleşir yaprağı tamamen kaplayabildiği gibi, sap ve başak'a da intikal eder. Bitki üzerinde yüzeysel bir tabaka oluşturan misel örtüsü su kaybına neden olduğundan bitkinin kurumasına sebep olur. Hastalığa yakalanan bitkiler yatmaya daha elverişli olduğundan dolayı mahsül kaybına sebep oldukları gibi, nekrozlar meydana getirerek özümleme yüzeyini azaltmaktada verimin düşmesine sebep olur.

RALLY^{EC 250} BUĞDAY'DA ÖNEMLİ SORUN OLAN SARI PAS VE KÜLLEME HASTALIKLARINA KARŞI ETKİLİ YENİ BİR MANTAR İLACIDIR.

BUĞDAYLARDA SARI PAS VE KÜLLEME HASTALIK BELİRTİLERİ GÖRÜLMEMEYE BAŞLANDIĞINDA KAPLAMA ŞEKLİNDE BİRİNCİ İLAÇLAMA YAPILIR, ŞARTLAR HASTALIKLAR İÇİN UYGUN GİTTİĞİNDE 10-14 GÜN ARAYLA İKİNCİ BİR İLAÇLAMA YAPILMALIDIR.

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen ilaç ayrı bir kaptaki bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek ilaçlama aletinin deposuna dökülür. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlk hastalık belirtileri görüldüğünde, kaplama olarak uygulanmalıdır.

Bağ

1.ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 20-30 cm boya erişince,

2.ilaçlama: Koruklar saçma tanesi iriliğini aldığı anda,

3.ilaçlama: İkinci ilaçlamadan 14 gün sonra yapılır, iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ilaçlamalara devam edilir.

Turuncgiller

İlk bahar sürgünlerinde hastalığın görülmesi ile.

Domates

Koruyucu olarak veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 10-14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir .

KARIŞILIRLIK DURUMU

Yüksek derecede asidik ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz.

 **Agrofarm**

AGROFARM KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.
Gülbahar Sokak Baytok Apt. No: 12 Daire:8 Kat:3
81090-01 KOZYATAĞI - KADIKÖY
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: (0.216) 658 88 50(pbx)
Fax: (0. 216) 410 07 90
www.agrofarm.net