

# SUNGOLD® 20 EC



**GENİŞ SPEKTRUMLU**

**KONTAKT VE MİDE ZEHİRİ ETKİLİ**

**TEMASTA YÜKSEK ANI ETKİ**

**BESLENMEYİ DURDURUCU ETKİ**

**KAÇIRICI ETKİ**

## **Mükemmel Sonuç**

Litrede 200 gram Esfenvalerate

**SUNGOLD® 20 EC YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE GELİŞTİRİLMİŞ DÜŞÜK DOZDA ETKİLİ BİR SENTETİK PYRETROİD İNSEKTİSİTTİR.**

**SUNGOLD® 20 EC GENİŞ SPEKTRUMLU BİR İNSEKTİSİTTİR.**

**SUNGOLD® 20 EC KONTAKT VE MİDE YOLUYLA BÖCEKLERİ KONTROL EDER,**

**SUNGOLD® 20 EC BÖCEKLERLE DIREK TEMASTA YÜKSEK ANI ETKİYE SAHİPTİR**

**SUNGOLD® 20 EC NİN AYRICA KAÇIRICI ETKİSİ VE BESLENMEYİ ENGELLEYİCİ ETKİSİ DE OLUP, BU NEDENLE BÖCEKLER İLAÇLANAN YERE GELMEZLER VEYA İLAÇLI BİTKİLERİ YEMEZLER.**

### KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Pamuk Yaprak Piresi ( <i>Empoasca decipiens</i> )	7.5 ml/da,nimf,ergin	7 gün
Pamuk	* Yeşil Kurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> ) Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.	60 ml / da, larva	7 gün
Domates (Tarla)	Yeşil Kurt ( <i>Heliothis armigera</i> )	60 ml / da, larva	7 gün
Bağ	Salkım Güvesi ( <i>Lobesia botrana</i> )	7.5 ml / 100 lt. su, larva	14 gün
Mısır	Mısır Koçan Kurdu ( <i>Sesamia nonogrioides</i> )	30 ml / da, larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama)	21 gün
Mısır	Mısır Kurdu ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	30 ml / da, larva (15 gün ara ile 3 ilaçlama)	21 gün
Elma	Elma İç Kurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	5 ml / 100 lt. su, larva	7 gün

### KULLANIM ŞEKLİ

Once tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır. sonra kısmen su dolu aletin deposuna karıştırılarak konulur ve depo su ile tamamlanır.

### Kalibrasyon

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

- İlaçlamalar sabah çığ kalktıktan sonra ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
- Her türlü ilaçlama aletiyle uygulanabilir.
- İlacın zararlılara temasını sağlamak için yaprakların alt yüzleri de dahil olmak üzere ilaçın bitkinin her tarafına iyi bir şekilde püskürtülmeli gerekir.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Kuvvetli alkali özellikteki ilaçlar hariç, bilinen insektisit ve fungisitlerin çoğuyla karıştırılarak kullanılabilir.

TAVSİYELERE UYGUN OLARAK KULLANINIZ.



Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Tel: 114

Zehirlenme durumlarında arayınız.



Agrofarm

AGROFARM KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.

Gülbahar Sokak Baytok Apt. No: 12 Daire:8 Kat:3

81090-01 KOZYATAĞI - KADIKÖY

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: (0.216) 658 88 50(pbx)

Fax: (0.216) 410 07 90

[www.agrofarm.net](http://www.agrofarm.net)

**AMBALAJ ŞEKLİ : 100 ml., 250 ml ve 1 Lt**



Pamuk Yaprak Piresi (*Empoasca decipiens*)



Yeşil Kurt (*Helicoverpa armigera*)



Yeşil Kurt (*Heliothis armigera*)



Salkım Güvesi (*Lobesia botrana*)



Mısır Koçan Kurdu (*Sesamia nonogrioides*)



Mısır Kurdu (*Ostrinia nubilalis*)



Elma İç Kurdu (*Cydia pomonella*)

SUNGOLD 20 EC ISO 9001:2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, ISO:14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ, VE OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SERTİFİKALARININ TÜMÜNE SAHİP TESİSLERDE ÜRETİLMİŞTİR.