

GASTOXİN 57% Tablet

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi
Hububat Depolarında	Fare ve Sıçanlar (<i>Rattus rattus</i> , <i>Rattus norvegicus</i> , <i>Mus musculus</i>)	1 tablet (3-6 g) / 1 m ³ hacime, zararlı görüldüğünde
Kuru Meyvelerde	Kuru İncir Kurdu (<i>Ephestia sp.</i>) Kuru Meyve Güvesi (<i>Plodia interpunctella</i>) Tütün Güvesi (<i>Ephestia elutella</i>) Kuru Üzüm Güvesi (<i>E. figuliella</i>) İç Fındık Güvesi (<i>Paralipisa gularis</i>) Ekşilik Böcekleri (<i>Carpophilus spp.</i>) Testereli Böcekler (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>) Kuru Meyve Akarı (<i>Carpoglyphus lactis</i>)	1-2 tablet (3-6 g) / 1 m ³ hacime, ergin
Mısır Ambarlarında	Arpa Güvesi (<i>Sitotroga cerealella</i>) Pirinç Biti (<i>Sitophilus oryzae</i>) Mısır Biti (<i>Sitophilus zeamais</i>)	1-2 tablet (3-6 g) / 1 m ³ hacime, ergin
Ambarlanmış tahıl ve mamullerindeki zarar yapan böceklere karşı		1 tablet (3 g) / 1 m ³ hacime kullanılır.

KULLANMA ŞEKLİ : Çuvallanmış ve döküm halindeki tahıl veya diğer ürünlerin açıkta veya depolarda fumigasyonu için yiğın üzerine gaz geçirmez bir örtü çekilir ve tabletler ile temastan sakınarak gerekli miktar **GASTOXİN 57 % TABLET** tableti yiğının farklı seviyelerine yerleştirilir. Gaz kaçmasını önleyecek ve hava geçirmeyecek şekilde örtüyü yiğının tabanına doğru çekmeli ve kenarları kum torbaları ile iyice kapatılmalıdır. Çelik veya beton silolarda ürün için fumigant tabletleri özel sonda aletleri ile, ürünün çeşitli derinliklerine dağıtılmalıdır. Gazlama süresi hava sıcaklığına bağlı olarak değişir. 12-16 °C 'de 5 gün , 16-20°C 'de 4 gün, 20°C 'nin üstündeki sıcaklıklarda 3 gündür. Tabletleri yerleştirme planı önceden yapılmalı ve bu işlem yarım saatte bitirilmelidir.

KORUNMA TEDBİRLERİ : Diğer ilaçlara uygulanan tedbirlere ilave olarak lastik eldiven ve bot giyilmelidir. Kapalı yerde ilaç kabı açılmamalı, ilaçlama anında ve 24 saat süre ile ventilasyon yapılmalıdır.

TABLETLERİ YERLEŞTİRME PLANI ÖNCE DEN YAPILMALI VE BU İŞLEM EN GEÇ YARIM SAATTE BİTİRİLMELİDİR.



GASTOXİN 57 % TABLET,
90 gramlık ambalajlarda
kolisinde 35 adet bulunmaktadır.



GASTOXİN 57 % TABLET,
3'er gramlık tabletler halinde ambalajında
30 adet bulunmaktadır.



Kuru Meyve Güvesi



Tütün Güvesi
(Ergin)



Ekşilik Böcekleri



Rattus rattus



Arpa Güvesi




Mısır Biti



Pirinç Biti



Testereli Böcekler



Kuru İncir Kurdu (Ergin - Larva)