

Pronto 300 EC

Buğday, Antep Fıstığı ve Şeker Pancarında Kullanılan Geniş Spektrumlu, Sistemik Mantar İlacı

- Mükemmel Sistemik Güç
- Uzun Süreli Koruma
- Hastalıklara Karşı Koruyucu ve Tedavi Edici Özellik
- Sağlıklı Bitkiler ve Daha Verimli Ürünler
- Ekonomik Çözüm



Pronto 300 EC

- Mükemmel Sistemik Güç
- Uzun Süreli Koruma
- Hastalıklara Karşı Koruyucu ve Tedavi Edici Özellik
- Sağlıklı Bitkiler ve Daha Verimli Ürünler
- Ekonomik Çözüm

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	İlaçlama Aralığı	Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Septorya Yaprak Lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	40 ml / da	21-28 gün	21 gün
	Pas (<i>Puccinia spp.</i>) Külleme (<i>Erysiphe graminis f.sp.tritici</i>)	50 ml / da		
Antepfıstığı	Karazenk (<i>Septoria pistacina</i>)	50 ml / 100 L. su		21 gün
Şeker Pancarı	Pancar Yaprak Leke Hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	30 ml / da	15-20 gün	21 gün



Septorya Yaprak Lekesi
(*Septoria tritici*)

Pas (*Puccinia spp.*)

Külleme
(*Erysiphe graminis f.sp.tritici*)

Karazenk
(*Septoria pistacina*)

Pancar Yaprak Leke Hastalığı
(*Cercospora beticola*)

Pronto 300 EC, Buğday, Antepfıstığı ve Şeker pancarında kullanılan geniş spektrumlu sistemik bir fungisittir. İhtiya ettiği aktif maddeler, bitki yeşil aksamı tarafından süratle bünyeye alınır ve mantar etmenlerinin bitkiye girişini engeller. Bu aktif maddeler, hücre çeperlerinde sterol biyosentezini engeller ve böylece mantarların gelişmesi engellenmiş olur. İlaç hem koruyucu hem de tedavi edici özellikte olup, enfeksiyonların yüksek seviyede ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, ilaçlamaların erken devrelerde yapılması tavsiye edilir.

Buğday: Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır, gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Antep Fıstığı : Birinci ilaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi izleyen meyvelerin buğday tanesi kadar olduğu dönemde yapılır. Hastalık koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla ikinci ve diğer ilaçlamalar yapılır.

Şeker Pancarı: Pancar Yaprak Leke Hastalığında ilk ilaçlama henüz hastalık belirtileri ortaya çıkmadan (Koruyucu olarak) yapılır.

İLACIN HAZIRLANMASI

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kaptan az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU

Yaygın olarak kullanılan birçok ilaç ile tank karışımı olarak kullanılabilir. Tereddüt halinde bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

İlacı kullanmadan önce ilacın etiketini dikkatlice okuyunuz ve tavsiyelere uyunuz.
Ulusal Zehir Danışma Hattı: 114



AGROFARM KİMYA SAN. Ve TİC. A.Ş.
Gülbahar Sokak Baytok Apt. No: 12 D: 8 Kat: 3 81090 -01 Kozluca / Kadıköy / İSTANBUL
Tel: +90.216 658 88 50 - Fax: +90.216 410 07 90 - Web: www.agrofarm.net

Agrofarm